

容 度
已 国家 定 。

8.2 控制

当 技 控制

免与 、 和 接 。 休息前和操作 品后 即 手。

个体 护 备

/ 保护

安全 使 官 准如NIOSH (国) 或 EN 166(0) 与批准 备 护 。

保护

戴手套取 手套在使 前必 受 。

使 合 手套(不 接 手套外), 免任何 位接 产品.
使 后 将 手套 据 关 律 和 效 实 室 序 慎处 . 并吹干双

所 择 保护手套必 合EU 89/686/EEC 定和从它 出 EN 376 准。

完全接

: 丁

小 层厚度 0.11 mm

剂 : 480 min

Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, . M)

保护

EN % .



IARC: 产品中 大于或 于 0.1%含 分 IARC 别为可 或 定 人 。

性

及其化合 似 , 可 。在动 中 据 性 , 在人中 据可 性。

异性 器官 性 (一 接)

据

异性 器官 性 (反复接)

据

吸入危

据

在 健康影响

吸入

摄入

吸入可 害。 对 、 和上呼吸 坏力强

吞会中 。 引 伤。

吸收可 害。 引 伤。

引 伤。

接 后 征兆和

据我们所 , 化学, 和 性性 尚 完 。

度 子会导 头 和 , 如 摄入 引 损伤。 、失 、 效应和 功 乱

报 。可 出 中 效应包括失 、 力 、感 丧失、抽搐 。反复接 子会发

、呕吐和 效应例如 、抽 和反射亢 。

加

化学 性作 : 据